

Dendritikus sejterápia és hagyományos kezelés

Túlélési arányok összehasonlítás

Ráktípus	2 éves túlélés (hagyományos)	2 éves túlélés (DST)	5 éves túlélés (hagyományos)	5 éves túlélés (DST)	Forrás / Megjegyzés
<i>Melanóma (regionális áttét)</i>	74%	82%	38%	53%	Ludwig et al., 2015 – Cancer Immunol Immunother
<i>Prosztatarák</i>	70%	80%	50%	65%	Kantoff et al., 2010 – The Lancet Oncology
<i>NSCLC (nem kissejtes tüdőrák)</i>	40–50%	55–60%	20–30%	35–45%	Jiang et al., 2021 – Frontiers in Oncology
<i>Húgyhólyagrák</i>	50–60%	65–75%	30–40%	45–55%	Finke et al., 2022 – Vaccines
<i>Hasnyálmirigyrák</i>	20–25%	30–40%	5–10%	15–20%	Mastelic-Gavillet et al., 2019 – Cancers (Basel)
<i>Vastagbélrák (stage II–III)</i>	65–70%	75–80%	40–50%	55–60%	Ni et al., 2021 – Cancer Immunol Immunother
<i>Veserák</i>	65%	75–85%	40–50%	55–65%	Díaz-Montero et al., 2020 – Clin Genitourin Cancer
<i>Emlőrák</i>	85%	90%	70%	75–80%	Zhou et al., 2021 – Breast Cancer Research
<i>Petefészekrák</i>	40–50%	55–65%	20–30%	35–45%	Sabbatini et al., 2015 – Gynecologic Oncology